

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

DLP 15-7-81811425

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL 70 F

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P Montpellier 5238-57

N° 13 - 9 juillet 1981

## VIGNE

### EUDEMIS

Le second vol s'effectue de façon très étalée, par suite de l'installation de conditions climatiques anormalement fluctuantes. Si, des pontes ont été décelées assez rapidement au cours de la 2ème quinzaine de juin dans les situations précoces : Perpignan, Costières de Nîmes, Montpellier-Méjanelle, Narbonne, elles ont débuté que depuis quelques jours dans les autres secteurs habituellement concernés.

Les premières éclosions sont fort échelonnées, selon les situations, parfois elles n'ont pas encore eu lieu. Ce décalage, assez inhabituel, se traduit par la nécessité de n'intervenir qu'après avoir procédé au repérage des jeunes chenilles. Elles sont présentes à Perpignan, par contre, dans l'Hérault, elles n'ont pas encore été décelées à ce jour.

On aura recours à des produits agissant par vapeur : dialiphos, étrinphos, malathion et surtout les parathions à longue durée d'action (type Penncap).

### ACARIENS et CICADELLES

Ces ravageurs sont actuellement visibles : le bulletin précédent a précisé les modalités de lutte.

### MILDIOU

Cette maladie demeure peu préoccupante en tous secteurs. L'usage des produits à base d'éthyl phosphite est interdit durant les deux mois précédant les vendanges.

### BOTRYTIS

La lutte contre cette maladie s'appuie sur une série de 4 interventions, citée dans le bulletin précédent. Des allègements font l'objet d'études.

Actuellement, au stade de la fermeture de la grappe (stade dit B), l'humectation du feuillage qui conditionne l'évolution du champignon, est devenue plus fréquente, par suite d'un relèvement sensible de l'état hygrométrique.

Sur cépages sensibles, tel le Grenache par exemple, et en bord de mer, une intervention est à réaliser (traitement B) avec une spécialité anti-botrytis spécifique.

P. 399



Ailleurs, il demeure possible d'utiliser une formulation fongicide renfermant du folpel (moins coûteuse). Il est nécessaire dans tous les cas de disposer d'un appareillage bien adapté à enrober les grappes pour obtenir une bonne efficacité des traitements.

N.B. - Une poudre pour poudrage à base de vinchlozoline et de soufre vient d'obtenir une autorisation provisoire de vente contre le Botrytis et l'Oïdium. Il s'agit de RONILAN SP (dose d'emploi produit commercial : 30 kg à l'hectare).

### ARBRES et ARBUSTES FRUITIERS

#### POU de SAN JOSE : région de Perpignan

L'essaimage de la 2ème génération du Pou de San José est en cours dans le fover d'Elne.

La lutte obligatoire contre ce ravageur doit être effectuée à l'aide de méthidathion (ULTRACIDE 20) à la dose de 40 grammes de matière active à l'hectolitre d'eau. Deux applications seront réalisées à 10 - 12 jours d'intervalle.

Le délai avant récolte fixé à 15 jours doit être strictement respecté. Si la récolte est en cours, attendre son achèvement pour intervenir.

#### CERISIER

#### ANTHRACNOSE

Les symptômes de la maladie s'extériorisent sous forme de taches nécrotiques sur les feuilles. Les feuilles attaquées peuvent se dessécher et subir une chute précoce. La maladie est enrayée à la suite d'applications à base de cuivre : Bouillie bordelaise à 1 % ou oxychlorure à 0,500 kg à l'hectolitre d'eau. Eviter les périodes pluvieuses pour ne pas "brûler". Le traitement doit être effectué après récolte vers mi-juillet.

---

/		/
/	RESPECTER STRICTEMENT les DELAIS d'EMPLOI	/
/	avant RECOLTE et ATTENTION aux MELANGES trop	/
/	COMPLEXES REALISES à la FERME	/

---

1'INGENIEUR en CHEF d'AGRONOMIE  
CHEF de CIRCONSCRIPTION,

V. LAGAUE

Tirage du 9 juillet 1981 - 1100 exemplaires